



**INSTITUT ZA
PREHRAMBENE
TEHNOLOGIJE
U NOVOM SADU**



Izveštaj o rezultatima međulaboratorijskog
poređenja

Odabrani pokazatelji kvaliteta pšenice

Jul 2023. godine

Organizator međulaboratorijskog poređenja:
NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE U NOVOM SADU
Bulevar cara Lazara 1
21 000 Novi Sad
Telefon/faks: (+ 381 21) 450-725; 450-728; 450-730
web: www.fins.uns.ac.rs
Kontakt osoba:
dr Milica Pojić
Tel: (+ 381 21) 485 3782
e-mail: medjulab@fins.uns.ac.rs

Lista izmena i dopuna			
Verzija	Opis izmene/dopune	Strana	Datum
2.0	Za učesnika pod šifrom 1 su unete korišćene metode ispitivanja sadržaja vode i proteina NIRS metodom	8,9	14.07.2023.
2.0	Za učesnika pod šifrom 23 je ispravljen sadržaj proteina (klasično) u odnosu na korekcioni faktor 5,7. Sledstveno tome promenjene su z-vrednosti.	11	14.07.2023.
3.0	Ispravka u tabeli sa rezultatima određivanja sadržaja proteina i u pratećem tekstu u odnosu na dodeljenu vrednost, standardnu devijaciju reproduktivnosti i mernu nesigurnost a u vezi sa izmenom u V2.0	11-12	20.07.2023.
3.0	Z-vrednosti za ukupan sadržaj primesa su date na dve decimale	5	20.07.2023.
3.0	Z-vrednosti za broj padanja po Hagbergu su date na dve decimale	7	20.07.2023.

1 Uvod

Po svojoj definiciji međulaboratorijska poređenja predstavljaju organizaciju, izvođenje i vrednovanje ispitivanja nad istim ili sličnim predmetima ispitivanja od strane dve ili više laboratorija, a u skladu sa prethodno utvrđenim uslovima. Takođe, ona se koriste i za utvrđivanje sposobnosti laboratorija za ispitivanje ili merenje (tzv. *proficiency testing*). Učešće u međulaboratorijskim poređenjima pruža laboratorijama objektivan način za ocenjivanje i prikazivanje pouzdanosti podataka do kojih dolaze, poređenjem rezultata ispitivanja i merenja iz dve ili više laboratorija.

Ciljevi međulaboratorijskih poređenja mogu biti :

- 1) utvrđivanje sposobnosti pojedinačnih laboratorija za obavljanje određena ispitivanja i merenja, kao i za praćenje stalne sposobnosti laboratorija za ispitivanje;
- 2) uočavanje problema u laboratorijama, kao i iniciranje aktivnosti za njihovo prevazilaženje, kao što su npr. individualne sposobnosti zaposlenih ili etaloniranje instrumenata;
- 3) uspostavljanje efektivnosti i uporedivosti novih metoda ispitivanja ili merenja, slično kao i za praćenje novouspostavljenih metoda;
- 4) obezbeđivanje dodatnog poverenja kod korisnika usluga laboratorije;
- 5) utvrđivanje razlika među laboratorijama;
- 6) utvrđivanje karakteristika neke metode;
- 7) dodeljivanje vrednosti referentnim materijalima (RMs), kao i za ocenjivanje njihove pogodnosti za korišćenje u određenim procedurama ispitivanja ili merenja.

Sprovođenje i učešće u međulaboratorijskim poređenjima, kao i sam učinak laboratorije u istim predstavlja važan dokaz kod ocene tehničke kompetentnosti laboratorije od strane akreditacionih tela, uz napomenu da je veoma važno razlikovati vrednovanje kompetentnosti laboratorije ocenom njenog ukupnog rada u odnosu na prethodno utvrđene zahteve, i vrednovanje rezultata učešća laboratorije u međulaboratorijskom poređenju, što se može smatrati samo informacijom o tehničkoj kompetenciji laboratorije za ispitivanje u jednom jedinom trenutku, pod specifičnim uslovima nekog ispitivanja (ili više ispitivanja), u okviru jedne, određene šeme.

1.1 Statističke metode za obradu dobijenih rezultata

Cilj primenjenih statističkih postupaka je da se rezultati prikažu i ocene na jednostavan i transparentan način koji omogućava laboratorijama učesnicama, kao i drugim zainteresovanim stranama jednostavno razmatranje. Prilikom statističke obrade rezultata dobijenih u međulaboratorijskom poređenju treba razmotriti:

- preciznost i istinitost dobijenih rezultata,
- razlike između laboratorija učesnica na željenom nivou poverenja,
- broj laboratorija učesnica,
- broj uzorka za ispitivanje i broj ponovljenih ispitivanja na svakom uzorku,
- procenu dodeljene vrednosti,
- procenu nekonistentnih vrednosti.

Vrednovanje rezultata laboratorija učesnica sastoji se iz:

- 1) određivanja dodeljene vrednosti,
- 2) primene statističkih metoda za ocenu sposobnosti, i
- 3) vrednovanja sposobnosti laboratorija.

Rezultate dobijene u međulaboratorijskom poređenju potrebno je transformisati u statističke veličine radi njihove lakše interpretacije i omogućavanja poređenja. Cilj transformisanja podataka je merenje odstupanja rezultata dobijenih u pojedinačnoj laboratoriji-učesnici od dodeljene vrednosti.

Za statističku obradu rezultata dobijenih u međulaboratorijskom poređenju često se koriste mere varijacije (standardna devijacija, koeficijent varijacije ili relativna standardna devijacija, procenti, medijana apsolutne devijacije i sl.). Takođe, u slučaju kvantitativnih rezultata, rezultati dobijeni u međulaboratorijskom poređenju se transformišu u:

- Razliku između rezultata laboratorije učesnice (x) i dodeljene vrednosti (X), odn. $(x - X)$, koja se naziva procena bias-a laboratorije;
- Procentnu razliku, $\frac{x - X}{X} \times 100$;
- Procenat ili rang;
- tzv. z-rezultat, $z = \frac{x - X}{s}$ gde je s standardna devijacija.

1.1.1 Interpretacija z-rezultata

Osnovna ideja tzv. z-rezultata je da omogući poređenje rezultata dobijenih u međulaboratorijskom poređenju, bez obzira na koncentraciju sastojka od interesa, prirodu predmeta ispitivanja, kao i fizički princip koji se nalazi u osnovi merenja.

- Z-rezultat od 0 ukazuje na savršen rezultat, što predstavlja redak slučaj čak i za najkompetentnije laboratorije;
- približno 95% z-rezultata nalaziće se između -2 i +2. Predznak z-rezultata (-/+) ukazuje na negativno ili pozitivno odstupanje u odnosu na dodeljenu vrednost. Z-rezultati koje se nalaze u ovom opsegu smatraju se prihvatljivim ili zadovoljavajućim.
- Z-rezultat izvan opsega -3 do +3 smatra se neuobičajenim i ukazuje na potrebu iznalaženja uzroka odstupanja i njegovom otklanjanju. Rezultati u ovom opsegu smatraju se neprihvatljivim ili nezadovoljavajućim, i svakako zahtevaju preispitivanje.
- Z-rezultat u opsegu -2 do -3, kao i u opsegu 2 do 3 može se očekivati u 5 % slučajeva, i smatra se sumnjivim.

1.1.2 Određivanje dodeljene vrednosti

Dodeljene vrednosti treba da budu utvrđene tako da je na osnovu njih omogućeno korektno vrednovanje rezultata laboratorija učesnica.

Dodeljena vrednost može se odrediti na osnovu:

- rezultata ispitivanja dobijenih u referentnoj laboratoriji,
- certifikovanih vrednosti kod upotrebe certifikovanih referentnih materijala,
- konsenzusne vrednosti iz ekspertske laboratorije,
- konsenzusne vrednosti iz laboratorija-učesnica.

2 Međulaboratorijsko poređenje odabralih pokazatelja kvaliteta pšenice

Ispitivanje: Određivanje odabralih pokazatelja kvaliteta pšenice, i to:

- Određivanje ukupnog sadržaja primesa,
- Određivanje zapreminske mase,
- Određivanje broja padanja po Hagberg-u,
- Određivanje sadržaja vode primenom bliske infracrvene spektroskopije,
- Određivanje sadržaja proteina primenom bliske infracrvene spektroskopije,
- Određivanje sadržaja vode klasičnim načinima,
- Određivanje sadržaja proteina klasičnim načinima.

Predmet ispitivanja: Merkantilna pšenica

Broj ponovljenih ispitivanja: tri ponavljanja.

Laboratorijske učesnice: Učešće u međulaboratorijskom poređenju odabralih pokazatelja kvaliteta pšenice prijavilo je ukupno 12 laboratorija (*redosled u tabeli ne odgovara šifriranju laboratorija*)

Laboratorijske učesnice	
Jugoinspekt d.o.o. Novi Sad	Novi Sad
Enološka stanica d.o.o.	Vršac
Danubius d.o.o.	Novi Sad
DON DON, d.o.o., Ogranak pekara Zrenjanin.	Beograd
Eko-lab d.o.o.	Padinska Skela
SP Laboratorija	Bečeј
Zavod za javno zdravlje "Timok"	Zaječar
Zavod za javno zdravlje	Šabac
IR Institut "Tamiš", d.o.o	Pančevo
Žito-Bačka d.o.o.	Kula
Žitobanat d.o.o.	Vršac
FINSLab	Novi Sad

U tabeli je dat prikaz broja laboratorijskih učesnika koji su prijavili svoje učešće u međulaboratorijskom poređenju prema odabranim metodama:

Metoda	Broj laboratorijskih učesnika
Ukupan sadržaj primesa	8
Zapreminska masa	6
Broj padanja po Hagberg-u	4
Sadržaj vode bliskom infracrvenom spektroskopijom	6
Sadržaj proteina bliskom infracrvenom spektroskopijom	7
Sadržaj vode klasičnim načinima	9
Sadržaj proteina klasičnim načinima	8

Dodeljena vrednost: Za sve metode obuhvaćene međulaboratorijskim poređenjem dodeljena vrednost određena je konsenzusom na nivou laboratorijskih učesnika.

Statističke metode: Vrednovanje sposobnosti laboratorijskih učesnika izvršeno je na osnovu z-rezultata, izračunata je standardna devijacija reproduktivnosti, kao i proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja.

3 Rezultati međulaboratorijskog poređenja

3.1 UKUPAN SADRŽAJ PRIMESA, %

U tabeli 1 su dati rezultati određivanja ukupnog sadržaja primesa u uzorku pšenice, kao i rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost određena je konsenzusom, kao srednja vrednost rezultata laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za određivanje ukupnog sadržaja primesa u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorija konvertovane su u tzv. z-vrednosti (Tab. 1).

Tabela 1

Rezultati određivanja ukupnog sadržaja primesa (%) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom poređenju

Laboratorija	Ponavljanja	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Z-vrednost	Korišćen metod			
1	5,28	5,587	0,277	0,12	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	5,66							
	5,82							
2	4,93	4,763	0,156	-0,24	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	4,74							
	4,62							
3	6,67	6,800	0,130	0,64	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	6,93							
	6,80							
4	4,40	4,367	0,058	-0,41	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	4,30							
	4,40							
5	0,318	0,318	0,002	-2,15*	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	0,320							
	0,317							
6	8,09	7,950	0,140	1,13	SRPS EN ISO 15587			
	7,95							
	7,81							
8	6,38	6,683	0,287	0,59	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	6,72							
	6,95							
24	5,78	6,047	0,560	0,31	SRPS EN 15587:2019			
	6,69							
	5,67							
DODELJENA VREDNOST		5,31						
BROJ UČESNIKA		8						
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI		1,24						
Proširena merna nesigurnost (k=2)		0,88						

*statistički outlier

Dobijene vrednosti određivanja ukupnog sadržaja primesa u uzorku pšenice kretale su se u opsegu od 0,318% (laboratorija 5) do 7,950% (laboratorija 6) sa srednjom vrednošću od 5,31% koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. z-vrednosti. **Rezultati dobijeni u laboratoriji 5 pokazuju negativno odstupanje u odnosu na dodeljenu vrednost i smatraju se neprihvatljivim (Z-rezultat > 3). Primenom Grubb-ovog testa (n=8) utvrđeno**

je da rezultati dobijeni u laboratoriji 5 predstavljaju statistički outlier ($P<0,05$) (kritična Z-vrednost iznosi 2,13) (ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision of measurement methods and results, Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method)), te nisu uzeti u obzir prilikom izračunavanja standardne devijacije reproaktivnosti i merne nesigurnosti. Z-vrednosti ostalih laboratorijskih učesnika su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru sposobljenost za određivanje ukupnog sadržaja primesa u uzorku pšenice (kritična Z-vrednost izračunata na osnovu Grubb-ovog testa iznosi 2,12). Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja je 0,88%.

3.2 ZAPREMINSKA MASA, kg/hl

U tabeli 2 su dati rezultati određivanja zapreminske mase uzorka pšenice, kao i rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost je određena konsenzusom kao srednja vrednost rezultata laboratorijskih učesnika. Za ocenu sposobljenosti laboratorijskih učesnika za određivanje zapreminske mase pšenice, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorijskih učesnika su konvertovane u tzv. z-vrednosti (Tab. 2).

Tabela 2

Rezultati određivanja zapreminske mase (kg/hl) uzorka pšenice u međulaboratorijskom poređenju

Laboratorijski učesnik	Ponavljanja	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Z-vrednost	Korišćen metod			
1	81,09	81,12	0,06	0,23	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	81,19							
	81,09							
3	80,40	80,23	0,21	-1,74	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	80,30							
	80,00							
4	81,20	81,27	0,06	0,55	Chopin Aqua-TR II			
	81,30							
	81,30							
5	81,50	81,53	0,06	1,14	UPI.1.2013			
	81,50							
	81,60							
6	81,09	81,15	0,06	0,30	SRPS EN ISO 7971-3			
	81,18							
	81,19							
24	80,80	80,80	0,00	-0,48	SRPS EN ISO 7971-3:2019			
	80,80							
	80,80							
DODELJENA VREDNOST		81,02						
BROJ UČESNIKA		6						
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI		0,45						
Proširena merna nesigurnost (k=2)		0,37						

Dobijene vrednosti određivanja zapreminske mase uzorka pšenice kretale su se u opsegu od 80,23 (laboratorijski učesnik 3) do 81,53 kg/hl (laboratorijski učesnik 5) sa srednjom vrednošću od 81,02 kg/hl koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. z-vrednosti. Z-vrednosti svih laboratorijskih učesnika su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru

osposobljenost za određivanje zapremske mase uzorka pšenice (Kritična Z vrednost izračunata na osnovu Grubb-ovog testa iznosi 1,89). Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,37 kg/hl.

3.3 BROJ PADANJA PO HAGBERG-U, s

U tabeli 3 su dati rezultati određivanja broja padanja po Hagberg-u u uzorku pšenice, kao i rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost određena je konsenzusom kao srednja vrednost rezultata laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za određivanje broja padanja po Hagberg-u u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorija konvertovane su u tzv. z-vrednosti (Tab. 3).

Tabela 3

Rezultati određivanja broja padanja po Hagberg-u (s) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom poređenju

Laboratorija	Ponavljanja	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Z-vrednost	Korišćen metod			
1	465	457,3	8,6	1,21	ICC 107/1			
	459							
	448							
2	400	411,7	10,4	-0,55	DM15			
	420							
	415							
3	437	436,0	14,5	0,39	SRPS EN ISO 3093:2010			
	450							
	421							
24	400	398,7	15,0	-1,05	SRPS EN ISO 3093:2010			
	383							
	413							
DODELJENA VREDNOST		425,9						
BROJ UČESNIKA		4						
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI		26,0						
Proširena merna nesigurnost (k=2)		26,0						

Dobijene vrednosti određivanja broja padanja po Hagberg-u u uzorku pšenice kretale su se u opsegu od 398,7 s (laboratorija 24) do 457,3 s (laboratorija 1) sa srednjom vrednošću od 425,9 s, koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. z-vrednosti. Z-vrednosti svih laboratorija-učesnica su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru osposobljenost za određivanje broja padanja po Hagberg-u u uzorku pšenice (kritična Z-vrednost prema Grubb-ovom testu iznosi 1,48). Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 26,0 s.

3.4 SADRŽAJ VODE (NIRS metod), %

U tabeli 4 su dati rezultati određivanja sadržaja vode u uzorku pšenice primenom NIRS metoda, kao i rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost je određena konsenzusom kao srednja vrednost rezultata laboratorija-učesnica. Za ocenu osposobljenosti laboratorija-učesnica za

određivanje sadržaja vode u pšenici primenom NIRS metoda, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorijskih su konvertovane u tzv. z-vrednosti (Tab. 4).

Tabela 4

Rezultati određivanja sadržaja vode NIRS metodom (%) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom poređenju

Laboratorijski opseg	Ponavljanja	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Z-vrednost	Korišćen metod
1	11,8	11,77	0,06	-0,35	Infratec 1241, FOSS
	11,8				
	11,7				
2 (oprema 1)	11,8	11,80	0,10	-0,29	Infratec 1241 User Manual
	11,7				
	11,9				
2 (oprema 2)	11,9	11,83	0,12	-0,23	Infratec 1241 User Manual
	11,9				
	11,7				
3	11,7	11,67	0,06	-0,55	FOSS 91766797
	11,6				
	11,7				
4	13,0	13,00	0,00	2,02*	Infratec 1241
	13,0				
	13,0				
24	11,64	11,64	0,03	-0,60	5.4-3M-001 (Infratec 1241)
	11,61				
	11,66				
DODELJENA VREDNOST				11,95	
BROJ UČESNIKA				6	
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI				0,09	
Proširena merna nesigurnost (k=2)				0,07	

*statistički outlier

Dobijene vrednosti sadržaja vode u uzorku pšenice primenom NIRS metoda kretale su se u opsegu od 11,64% (laboratorijski opseg 24) do 13,00% (laboratorijski opseg 4) sa srednjom vrednošću od 11,95%, koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. z-vrednosti. **Rezultati dobiveni u laboratorijskom opsegu 4 pokazuju pozitivno odstupanje u odnosu na dodeljenu vrednost i smatraju se sumnjivim (Z-rezultat je u granicama od 2 do 3).** Primenom Grubba-ovog testa ($n=6$) utvrđeno je da rezultati dobiveni u laboratorijskom opsegu 4 predstavljaju statistički outlier ($P<0,05$) (kritična Z-vrednost iznosi 1,89) (ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision of measurement methods and results, Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method)), te nisu uzeti u obzir prilikom izračunavanja standardne devijacije reproduktivnosti i merne nesigurnosti. Z-vrednosti ostalih laboratorijskih učesnika su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru sposobnost za određivanje sadržaja vode u uzorku pšenice primenom NIRS metoda. Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,07%.

3.5 SADRŽAJ PROTEINA (NIRS metod), % na s.m.

U tabeli 5 su dati rezultati određivanja sadržaja proteina u uzorku pšenice primenom NIRS metoda, kao i rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost je određena konsenzusom kao srednja vrednost rezultata laboratorija-učesnika. Za ocenu sposobljenosti laboratorija-učesnika za određivanje sadržaja proteina u pšenici primenom NIRS metoda, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorija su konvertovane u tzv. z-vrednosti (Tab. 5).

Tabela 5

Rezultati određivanja sadržaja proteina NIRS metodom (% na s.m.) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom poređenju

Laboratorija	Ponavljanja	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Z-vrednosti	Korišćen metod			
1	12,16	12,15	0,04	-0,18	Infratec 1241, FOSS			
	12,10							
	12,18							
2 (oprema 1)	12,3	12,23	0,06	0,05	Infratec 1241 User Manual			
	12,2							
	12,2							
2 (oprema 2)	12,2	12,27	0,06	0,14	Infratec 1241 User Manual			
	12,3							
	12,3							
3	11,8	11,77	0,06	-1,21	FOSS 91766797			
	11,7							
	11,8							
4	12,0	12,10	0,10	-0,31	Infratec 1241			
	12,2							
	12,1							
10	13,05	12,96	0,14	2,03*	N/A			
	13,03							
	12,80							
24	11,99	12,02	0,05	-0,52	5.4-3M-001			
	12,08							
	11,99							
DODELJENA VREDNOST		12,21						
BROJ UČESNIKA		7						
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI		0,18						
Proširena merna nesigurnost (k=2)		0,14						

*statistički outlier

Dobijene vrednosti sadržaja proteina u uzorku pšenice primenom NIRS metoda kretale su se u opsegu od 11,77% na s.m. (laboratorija 3) do 12,96% na s.m. (laboratorija 10) sa srednjom vrednošću od 12,21% na s.m., koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. z-vrednosti. **Rezultati dobijeni u laboratoriji 10 pokazuju pozitivno odstupanje u odnosu na dodeljenu vrednost i smatraju se sumnjivim (Z-rezultat je u granicama od 2 do 3).** Primenom Grubb-ovog testa (n=7) utvrđeno je da rezultati dobijeni u laboratoriji 10 predstavljaju statistički outlier ($P<0,05$) (kritična Z-vrednost iznosi 2,02) (ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision of measurement methods and results, Part 2: Basic method for the

determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method)), te nisu uzeti u obzir prilikom izračunavanja standardne devijacije reproduktivnosti i merne nesigurnosti. Z-vrednosti ostalih laboratorijskih učesnika su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru sposobnost za određivanje sadržaja proteina u uzorku pšenice primenom NIRS metoda. Proširena merna nesigurnost koja proizlazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,14% na s.m.

3.6 SADRŽAJ VODE (klasično), %

U tabeli 6 su dati rezultati određivanja sadržaja vode u uzorku pšenice primenom klasičnih hemijskih ispitivanja, kao i rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost je određena konsenzusom kao srednja vrednost rezultata laboratorijskih učesnika. Za ocenu sposobnosti laboratorijskih učesnika za određivanje sadržaja vode u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorijskih učesnika su konvertovane u tzv. z-vrednosti (Tab. 6).

Tabela 6

Rezultati određivanja sadržaja vode (%) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom poređenju

Laboratorija	Ponavljanja	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Z-vrednost	Korišćen metod			
1	11,7	11,73	0,06	-0,12	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	11,7							
	11,80							
2	12,03	12,03	0,03	1,78	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	12,05							
	12,00							
4	11,70	11,76	0,07	0,05	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	11,74							
	11,84							
6	11,88	11,84	0,04	0,57	SRPS EN ISO 712			
	11,83							
	11,81							
7	11,74	11,74	0,01	-0,10	SRPS EN ISO 2171:2012			
	11,74							
	11,73							
8	11,76	11,76	0,01	0,07	EL10305005-01			
	11,76							
	11,77							
9	11,528	11,53	0,00	-1,45	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	11,531							
	11,528							
23	11,58	11,54	0,05	-1,40	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	11,48							
	11,55							
24	11,84	11,85	0,02	0,61	SRPS EN ISO 712:2012			
	11,87							
	11,83							
DODELJENA VREDNOST		11,75						
BROJ UČESNIKA		9						
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI		0,15						
Proširena merna nesigurnost (k=2)		0,10						

Dobijene vrednosti sadržaja vode u uzorku pšenice primenom NIRS metoda kretale su se u opsegu od 11,53% (laboratorijski broj 9) do 12,03% (laboratorijski broj 2) sa srednjom vrednošću od 11,75%, koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. z-vrednosti. Z-vrednosti svih laboratorijsko-članica su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru sposobljenost za određivanje sadržaja vode u uzorku pšenice (kritična Z-vrednost prema Grubbs-ovom testu iznosi 2,21). Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,10%.

3.7 SADRŽAJ PROTEINA (klasično), % na s.m.

U tabeli 7 su dati rezultati određivanja sadržaja proteina u uzorku pšenice primenom klasičnih hemijskih ispitivanja, kao i rezultati njihove statističke obrade. Dodeljena vrednost je određena konsenzusom kao srednja vrednost rezultata laboratorijsko-članica. Za ocenu sposobljenosti laboratorijsko-članica za određivanje sadržaja proteina u pšenici, srednje vrednosti rezultata pojedinačnih laboratorijskih su konvertovane u tzv. z-vrednosti (Tab. 7).

Tabela 7

Rezultati određivanja sadržaja proteina (% na s.m.) u uzorku pšenice u međulaboratorijskom poređenju

Laboratorijski broj	Ponavljanje	Srednja vrednost	Standardna devijacija	Z-vrednost	Korišćen metod			
1	11,85	11,85	0,03	-1,26	Pravilnik, Sl. list SFRJ 74/1988			
	11,82							
	11,88							
6	12,44	2,24	0,17	0,46	SRPS EN ISO 16634-2			
	12,12							
	12,16							
6a	12,05	11,88	0,15	-1,14	SRPS EN ISO 1871:2013			
	11,81							
	11,77							
7	12,06	12,07	0,02	-0,27	SRPS EN ISO 20483:2014			
	12,09							
	12,07							
8	12,10	12,13	0,07	-0,01	EL10305005-21			
	12,09							
	12,21							
9	12,43	12,37	0,06	1,03	SRPS EN ISO 16634-2:2016			
	12,37							
	12,31							
23	12,01	12,04	0,04	-0,42	VM70			
	12,08							
	12,03							
24	12,55	12,50	0,05	1,61	SRPS EN ISO 20483:2014			
	12,46							
	12,50							
DODELJENA VREDNOST		12,14						
BROJ UČESNIKA		8						
STANDARDNA DEVIJACIJA REPRODUKTIVNOSTI		0,23						
Proširena merna nesigurnost (k=2)		0,16						

Dobijene vrednosti sadržaja vode u uzorku pšenice primenom NIRS metoda kretale su se u opsegu od 11,85% (laboratorijski 1) do 12,50% (laboratorijski 23) sa srednjom vrednošću od 12,14%, koja ujedno predstavlja i dodeljenu vrednost u odnosu na koju su dobijene vrednosti transformisane u tzv. z-vrednosti. Z-vrednosti svih laboratorijsko-uchesnica su u granicama koje oslikavaju njihovu dobru sposobljenost za određivanje sadržaja proteina u uzorku pšenice (kritična Z-vrednost iznosi 2,13). Proširena merna nesigurnost koja proizilazi iz rezultata međulaboratorijskog poređenja iznosi 0,16% na s.m.